

Bölüm 21

İlerlemeyen Travay

Ceren SANCAR¹



- Servikal dilatasyonun ilerlemesinin ve fetal başın inişinin eylemde normalden yavaş olmasına veya durmasına ilerlemeyen travay denir.
- İlerlemeyen travay, doğumun her evresinde farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için klinik duruma göre değerlendirme yapılmalıdır.

Nedenleri

Motor

- ✓ Hipokontraktıl uterin aktivite
 - Güçlü olmayan kontraksiyonlar ve/veya
 - Seyrek kontraksiyonlar (<3-4 kontraksiyon/10 dk) ve/veya
 - Kısa süreli kontraksiyonlar (<50 sn) olması
 - Uterin aktivitenin 200-250 montevideo üniteden az olması
 - Bölgesel anestezi

Yolcu

- ✓ Baş pozisyonun oksiput anterior olmaması

Yol

- ✓ Baş-pelvis uygunsuzluğu
- ✓ Bantl halkası (patolojik retraksiyon halkası)

¹ Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Komplikasyon Yönetimi

- Doğum indüksiyonuna başlanmadan ve membranlar sıyrılmadan önce plasentanın aşağı yerleşimli olmadığından emin olunmalıdır.
- Neonatal respiratuar distres sendromu
 - Spontan eylemin başlamadığı durumlarda anne ve bebek açısından acil doğum gerekliliği yoksa doğum indüksiyonuna başlamadan önce gebelik haftasından ve fetal gelişimin tamamlandığından emin olunmalıdır.
- Uterin hiperstimülasyon
 - Tokoliz düşünülmalıdır.
- Başarısız indüksiyon
 - Bir siklus indüksiyon uygulandıktan sonra eylem başlamadıysa başarısız indüksiyon olarak kabul edilir.
 - Gebelik, gebenin genel durumu, fetal iyilik hali tekrar değerlendirilmelidir.
 - İndüksiyon başarısızlığı sonrasında uygulanacak yönetim seçenekleri;
 - Başka bir indüksiyon protokolü uygulamak (klinik koşullar ve anne isteği göz önünde bulundurulmalıdır).
 - Sezaryen doğum
- Kordon prolapsusu
 - Amniyotomi sırasında ortaya çıkacak kordon prolapsusunu önlemek için aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
 - Doğum indüksiyonuna başlamadan önce önde gelen kısmın angajmanı değerlendirilmelidir.
 - Vajinal muayene sırasında umbilikal kord prezentasyonu olmadığından emin olunmalı ve başın itilmemesine özen gösterilmelidir.
 - Bebeğin başı yukarda ise amniyotomiden kaçınılmalıdır.
- Uterin rüptür
 - Acil sezaryen ile bebek doğurtulmalıdır.

KAYNAKLAR

- * Creasy RK, Resnik R ve ark. (2019) Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice. 8th. Edition, Philadelphia, p: 723-757.
- *American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Clinical Management Guidelines For Obstetrician–Gynecologists Number 107, August 2009
- *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)(2008) Inducing labour Clinical Guideline (CG70) care. www.nice.org.uk