

Bölüm 32

Acil Obstetrik Bakımda Şiddetli Karın Ağrısı

Alpay YILMAZ¹




Genel Bilgiler

- Gebelerde gelişen akut karın tablosu obstetrik ya da non-obstetrik faktörlere bağlı olabilmektedir.
- Akut karındaki ağrı süresi dakikalardan saatlere ve haftalara kadar uzayabilen bir spektrumu içerir.
- Gebelikte yaşanan fizyolojik değişimler akut karın gelişim riskini arttırmaktadır.
- Gebelik nedeniyle tanı ve tedavi açısından zorluk yaşanmaktadır. Gebelikte yaşanan anatomik ve fizyolojik değişimin klinik bulguları maskeleymesi, farklı semptomların hissedilmesi ve tanı için yardımcı olacak radyolojik tetkiklerin fetusa potansiyel zararı nedeniyle kullanımından kaçınma nedenler arasında sayılabilir.
- Teşhis ve tedavide gecikme hem anne hem de fetüs için olumsuz sonuçlara yol açabilir.
- Gebelerin yaklaşık %0,5-2'si non-obstetrik akut karın nedeniyle opere olmaktadır
- Hastaları acil operasyona yönlendirilmede yardımcı olan X-ray ve bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiklerin fetusa potansiyel zararından duyulan endişe triyajda sıkıntı yaratmaktadır.

¹ İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Gebelerde Akut Karına Yaklaşım Şeması

Gebe olgularda şiddetli karın ağrısı, tanı ve tedavide ciddi problemler yaratmaktadır. Bu konuda sistematik yaklaşım aşağıda özetlenmiştir.



KAYNAKLAR

- * <https://www.uptodate.com/contents/approach-to-acute-abdominal-pain-in-pregnant-and-postpartum-women>Erişim Tarihi: 25.11.2020
- * Zachariah SK, Fenn M, Jacob K, Arthungal SA et al.. Management of acute abdomen in pregnancy: Current perspectives International Journal of Women's Health. 2019;11 119–134
- * Augustin G, Majerovic M. Non-obstetrical acute abdomen during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007;131(1):4–12.
- * Millet SB, Lledó JB, Castro PG, Gavara IG et al, Update on the Management of Non-obstetric Acute Abdomen in Pregnant Patients. Cirugía Española. 2016;94(5):257-265.