

24. PEDİYATRİK ACİLLER

24.1. ACİL SERVİSE GELEN HASTANIN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tubaş⁵³

Acil servislere başvuran çocuk hastalarda fiziksel istismardan şüphelenmek, bu hastaların hayati güvenliği için zorunludur. Yapılan çalışmalarda fiziksel istismar olduğu belirlenen çocukların yüzde 13'ünün sonraki beş yıl içinde başka bir fiziksel istismar olayına maruz kaldığı görülmüştür(1).

Fiziksel istismar açısından çocuklar değerlendirilirken ilk birkaç saat içindeki başvurularda, istismarın gerçekleştiğine kesin olarak karar vermek nadiren mümkündür. Bu dönemde aileyi suçlayıcı söylemlerden kaçınmak gereklidir. Hastanın hikayesi de değerlendirmede önemlidir. Hikayede değerlendirilmesi gereken noktalar **Tablo 1 de** gösterilmektedir.

Tablo 1. Hikayede fiziksel istismarı düşündüren bulgular (2)

Ciddi yaralanma olmasına karşın bunu açıklayacak travma hikayesinin olmaması

Yaralanma derecesi veya tipi için uygun olmayan hikaye

Tıbbi yardım için aşırı gecikme ya da açıklanamayan gecikme

Evde resüsitasyona atfedilen yaralanmalar

Tekrarlayan anlatımlarda değişen veya diğer gözlemcilerin anlattığından farklı hikayeler

Çocuğun kendisine zarar verdiğinin söylendiği ya da diğer küçük çocuklara veya evcil hayvanlara atfedilen ağır yaralanmalar(örneğin küçük bir bebeğin sıcak su musluğunu açarak kendini haşladığını söylemesi)

⁵³ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 2 puan | Anlaşılmaz seslerle cevap verir |
| 1 puan | Sözel cevabı yoktur. |

GKS sadece hastanın bilinç durumunu yansıtır. Asla tam bir nörolojik değerlendirme aracı değildir.

Hastanın ilk geliş GKS yapılması, hasta takiplerinde puanlamaların güvenilirliği açısından çok önemlidir.

Endotrakeal tüp, afazi olan hastalarda GKS'nin kullanımı kısıtlıdır. Endotrakeal tüp veya trakeostomisi olan hastalarda GKS'nin kullanılması durumunda, bu durum puanlama çizelgesine not edilmelidir. Puanlamada hastada endotrakeal tüp varsa (T+puan) şeklinde yazılabilir.

Yetişkin Glasgow Koma Skalası (GKS) 2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır. 2 yaşından küçük çocuklarda Pediatrik Künt Kafa Travması (PECARN Çalışması) skoru kullanılır.

Kaynaklar

1. Sternbach GL. The Glasgow coma scale. J Emerg Med. 2000;19(1):67-71.