

## GUİLLAİN-BARRÉ HASTALIĐI NEDİR?

# 16.

## BÖLÜM

Miraç YILDIRIM<sup>1</sup>

Guillain-Barré hastalığı; beyin ve omurilikten çıkarak organlara, kollara ve bacaklara uzanan sinirlere yanlılıkla bağışıklık sisteminin hasar vermesi sonucu oluşur.

### GUİLLAİN-BARRÉ HASTALIĐINA NELER SEBEP OLUR?

Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik olarak çocuklarınıza geçmez. Bulaşıcı değildir. Boğaz ağrısı veya ishale neden olan virüs veya bakteri enfeksiyonları sonrası, etkilenen kişinin bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularına saldırmaya başlamaktadır. Bağışıklık sistemi saldırısının hedefi sinir hücreleri olmaktadır.

### GUİLLAİN-BARRÉ HASTALIĐINDA HANGİ ŞİKÂYETLER VE BELİRTİLER GÖRÜLÜR?

Çoğunlukla ayaklarda veya ellerde karıncalanma, bacaklarda veya sırtta ağrı gibi belirtilerle başlar. Bunun ardından vücudun alt tarafından başlayıp yukarı doğru ilerleyen güçsüzlük ortaya çıkar. Bacaklarda zayıflık ilk olarak merdiven çıkmada ve yürümede güçlük veya küçük çocuklarda yürümeyi reddetme şeklinde fark edilir.

Hastalık kolları, solunum kaslarını ve hatta yüz, göz ve yutma kaslarını etkileyebilir. Çoğu çocukta belirtilerin ortaya çıkmasından sonraki ilk iki ila üç hafta içinde hastalık en ağır aşamaya ulaşır. Bu aşamada hastalık nefes alıp vermeyi veya yutmayı engelleyebilir. Bu nedenle bu çocukların bir süreliğine hastanede yatarak takip edilmesi gerekir. Hastalık süresince yutma, konuşma veya çiğne-

<sup>1</sup> Dr. Öğrt. Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı  
ORCID iD: 0000-0002-0215-1043

**KAYNAKÇALAR**

1. Rabie M, Ashwal S, Nevo Y: Inflammatory Neuropathies. In: Swaiman's Pediatric Neurology, Swaiman K. Ashwal S. Ferriero D. Schor N. Finkel R. Gropman A et al (eds). Elsevier, 6th ed. Edinburgh; 2018: 1086-91
2. Pina-Garza JE, James KC: Flaccid Limb Weakness in Childhood. In: Fenichel's Clinical Pediatric Neurology, Pina-Garza JE, James KC (eds). Elsevier, 8th ed. Philadelphia; 2019: 172-95