

Umbilikusun Nadir Bir Patolojisi: Primer Skuamöz Hücreli Kanser

105

Süleyman ATALAY¹

GİRİŞ

Umbilikus, doğum sonrasında göbek kordonun kesilip klemplenmesi sonrası oluşan skar dokusudur (1). Umbilikal bölgenin tümörleri oldukça nadirdir ve sadece birkaçı primer lezyonlardır. Umbilikal bölgede görülen kitleler genellikle metastazik lezyonlar şeklindeyken, primer skuamöz hücreli karsinom çok nadir görülmektedir. Umbilikusta görülen kitlesel lezyonların primer umbilikal skuamöz tümör olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

OLGU SUNUMU

52 yaşında kadın hasta göbek bölgesinde olan ve yaklaşık 1 senedir devam eden ağrı ve şişlik nedeniyle tarafımıza başvurdu. Alınan anamnezinde şikayetlerinin başladığı zamandan tarafımıza başvuruncaya kadar birçok merkeze müracaat ettiği ve hiçbir sonuç alamadığı öğrenildi. Hastanın hiçbir ek hastalığı yoktu. Dış merkezde çekirilmiş

yüzeysel doku usg de umbilikusta kistik lezyon olarak yorumlandığı görüldüğü üzerine hasta eksizyon önerildi ve operasyona alındı. Operasyon sırasında lezyonun kistten çok skiröz yapıda olduğu görüldü ve eksizyonel materyal histopatolojik incelemeye gönderildi. Histopatolojik incelemede iyi diferansiye keratinize tip skuamöz hücreli karsinomun subkutan yağlı dokuya 0,6 cm infiltrate olduğu ve epidermal keratinizasyonu gösterdiği rapor edildi (Fig.1A / 1B).

Vasküler, lenfatik invazyon görülmedi, perinöral invazyon görüldüğü. tümör hücreleri p63 antikoru ile yaygın nükleer pozitiflik gösterdiği, p53, p16 negatif olduğu, cerrahi sınırlarda tümör hücrelerine rastlanılmadığı rapor edildi. Kırmızı ok deri altı infiltrate skuamöz hücreli karsinom göstermektedir (Fig.1C / 1D).

Postoperatif takip sırasında yapılan takip ve tetkiklerde, hastada herhangi bir metastazik bulguya rastlanılmadı. Tümör kurulunda değerlendirilen hastaya ek tedavi verilmesine gerek duyulmadı.

¹ Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, suleyman_atalay@yahoo.com

Sonuç olarak; umbilikusta görülen malign kitleler çoğunlukla metastatik olmasına rağmen, kitlenin primer skuamöz hücreli karsinomu olabileceği umbilikusta görülen lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmeli, zamanında tanı ve tedavi yöntemi planlanmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Giuseppe Macripò, Virginia Caliendo, Marcella Grassi, Patrizia Lista, Simone Ribero, Elena Giaccone, Enrica Milanese, and Libero Ciuffreda. Squamous cell carcinoma of the umbilicus: management of an unusual localization. *Tumori*, 97: 236-238, 2011.
2. Lookingbill D, Spangler N, Sexton FM: Skin involvement as the presenting sign of internal carcinoma. A retrospective study of 7316 cancer patients. *J Am Acad Dermatol*, 22: 19-26, 1990.
3. Agur AMR, Lee MJ. *Grant's Atlas of Anatomy*. 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1999:106.
4. Yu J, Kim KW, Lee H, Lee Y, Yoon C, Kim M. Urachal remnant diseases: spectrum of CT and US findings. *Radiographics*. 2001;21:451-461.
5. Meine JG, Bailin PL: Primary melanoma of the umbilicus: report of a case and review of the relevant anatomy. *Dermatol Surg*, 29: 404-407, 2003.