

Hamilelikte İlaç Kullanımı

113

Natalie Kostelecky, RN, BSN and
Stephen M. Pastores, MD, FACP, FCCP, FCCM
Çeviri: Uz. Dr. Canan Ün

HAMİLELİKTE İLAÇ KULLANIMI

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gebelikte kullanıldığında yeni doğan defektine neden olacak potansiyel ilaçları 6 kategoride tanımlamıştır

(A,B,C,D,X ve N). Bu kategoriler belgelerin güvenilirliği ve kar zarar oranı ile belirlenmiştir. Bunlar anne sütünün içindeki farmasötik ajanlar ve bunların metabolitleriyle ilgili herhangi bir riski dikkate almazlar.

İlaçların sınıfı	FDA Gebelik Risk Kategorisi	İlaçların sınıfı	FDA Gebelik Risk Kategorisi
<i>Analjezik ve sedatif ajanlar</i>		Amiodaron	D
Asetaminofen	C	Digoksin	C
Asetil salisilik asit*	D	Diltiazem	C
Fentanil*	C	Esmolol	C
Hidromorfon*	C	Flekainid	C
Ibuprofen*	C (birinci ve ikinci trimester); D üçüncü trimester)	Metoprolol	C
Indometazin*	C (birinci ve ikinci trimester); D üçüncü trimester	<i>Antimikrobiyal ajanlar</i>	
Ketorolak*	C (birinci ve ikinci trimester); D üçüncü trimester)	Penisilin	B
Meperidin*	C	Sefazolin	B
Metadon*	C	Sefepim	B
Morfin*	C	Seftriakson	B
Oksikodon*	C	Imipenem-silastatin	C
Oksimorfon*	C	Meropenem	B
Midazolam	D	Amikasin	D
Lorazepam	D	Gentamisin	D
Propofol	B	Tobramisin	D
Deksmedetomidin	C	Eritromisin	B
<i>Anestezi ajanlar</i>		Levofloksasin	C
Halotan	C	Klaritromisin	C
İzofluran	C	Siprofloksasin	C
Ketamin	N	Vankomisin	C
Lidokain (lokal)	B	Linezolid	C
Propofol	B	Aztreonam	B
<i>Antiarritmik ajanlar</i>		Klindamisin	B
Adenozin	C	Metronidazol	B
		Trimetoprim-sulfametoksazol	D
		Tetrasiklin	D

(Devam)