

## DİREKT KOMPOZİT VENEERLER

# 4.

## BÖLÜM

*Ezgi SONKAYA<sup>1</sup>*

Kompozit veneerler, anterior dişlerin estetik restorasyonu için indirekt veneerlere alternatif olarak görülmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik kısıtlamaları olan hastalar için veya genç hastalarda ilk uygulanabilecek estetik tedavi olarak caziptirler. Kompozit veneerler, kama laterallerin görünümünü değiştirilmede, diastema kapatmalarında, büyük insizal kırıklarda, estetik olmayan bir rengi maskelemede, aşınmış ön dişlerin (atrizyon, abrazyon, korozyon ve abfraksiyon kaynaklı) restorasyonların kullanılabilir. Direkt kompozit veneerlerin diş dokusunun korunması, üstün fiziksel özellikler göstermesi, kenar uyumunun kabul edilebilir olması ve yeterli estetik özellikler göstermesi ve geri dönüştürülebilir olması gibi avantajları vardır. Ayrıca porselen restorasyonlarla karşılaştırıldığında, rezin kompozitlerin katat-rofik kırılma riski ve karşıt dişlerde aşındırıcı etkisi daha azdır. İndirekt yöntemle göre ek laboratuvar maliyetleri yoktur ve ekonomiktirler. Tedavi öncesi planlama, daha fazla ünit başında zaman gerektirme ve büyük çoğunlukla başarının hekimin bilgi ve el becerisine dayanması dezavantajlarındandır. Bunların dışında, kompozit rezinlerle estetik açıdan üstün sonuçlar elde etmek teknik olarak zordur. Zamanla renklenme eğilimi gösterirler ve belirli aralıklarla bakım gerektirebilirler.

<sup>1</sup> Öğretim Görevlisi Uzman Diş Hekimi, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye sonkayaezgi@yahoo.com