

Bölüm 15

KEMİĞİN İYİ HUYLU TÜMÖRLERİ

Evren Karaali

OSTEOİD OSTEOMA

Çapı 2 cm'den küçük olan ve primitif kemik lamelleri ve osteoid dokudan oluşan kemik lezyonlarına denir. İyi huylu kemik tümörlerinin %11'ini, tüm kemik tümörlerinin ise %5'ini oluşturur. Sıklıkla çocuk ve gençlerde görülen bu tümörün yaklaşık %70'i 20 yaşın altında görülür.

Tanı:

Bu tümör ağrıyla kendini gösterir. Ağrının karakteristik özellikleri ise gece daha belirgin olması, aspirin ve prostoglandin inhibitörü olan nonsteroid antiinflamatuara dramatik bir şekilde cevap vermesidir. Bunun haricinde bulunmuş olduğu lokalizasyona göre ağırlı skolyoz, kas atrofisi, sinovitis gibi durumlara sebep olabilir.

X-Ray: Parakortikal lokalizasyonlu santral bölgesi litik ve nidus içeren etrafı sklerotik bir dudakla çevrili 2 cm'den küçük lezyonlar olarak görülür. Nidusun görülmesi tanı koydurucu bir özellik olabilir. (Resim 1, 2)



Resim 1 Direk grafide nidusun etrafında oluşan kortikal kalınlaşmanın görünümü