


6.5. TİBİA PROKSİMAL BÖLGE KIRIKLARI



***Bu bölümde bazı resimler genç hastalara aittir. Bu bölümün daha iyi anlaşılması ve yaşlılarda nadir görülmesi nedeniyle bu yola başvurulmuştur.

Genel olarak yaşlı insanlarda tibia proksimal bölge kırıkları düşük enerjili travmalarla oluşur. Bu kırıklarda, redüksiyon ve güvenli internal fiksasyon zordur. Aslında bu bölgenin kırıkları aksiyel yüklenmelerle, yani kompresyon kuvvetleriyle oluştuğundan, bu bölgenin kırıklarında dokunun absorbe ettiği enerji miktarı tedaviyi de yönlendirir. Düşük enerjili travmalarla oluşmuş eklem içi kırıklarda, seçilmiş teknikten bağımsız olarak sonuçlar genellikle yüz güldürücüdür. Çünkü kartilaj ve kemik dokunun absorbe ettiği enerji miktarı minimal olduğu için, sonuçlar başarılıdır. Ancak yüksek enerjili travmalarda dokuların (kemik, kıkırdak ve yumuşak doku) absorbe ettiği enerji miktarı çok yüksek olduğu için tedavi tekniği bu kırıklarda önemlidir. Birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Konservatif tedavi, iskelet traksiyonu, indirekt teknikler, eksternal fiksatörler, intramedüller çiviler ve plak-vida sistemleri bu kırıklarda kullanılmaktadır. Bu kırıklar iki başlık altında incelenecektir. Eklem içi kırıklar ve eklem dışı kırıklar. Eklem içi kırıklarda Shatzger sınıflaması temel alınacaktır. Ancak bu sınıflama, her tip plato kırığını kapsamadığı için, bu kırıklar, ayrı bir sınıflama yapılarak incelenecektir.

- 1- İntra-Artiküler Tibia (Plato) Kırıkları
- 2- Ekstra-Artiküler Tibia Proksimal Kırıkları