




## Bölüm 11

# NORMAL GEBELİK

*Dilay KARADEMİR<sup>1</sup>*

### NORMAL GEBELİK TANIMI

Gebelik ürünlerinin normal olarak uterus veya anormal olarak uterus dışında başka bir yere (Over, tuba, salpenks, batin içi organlar) yerleşmesine gebelik denilir. Uterus dışında bir yere yerleşen gebelik dış gebelik olarak tanımlanır. Normal gebeliği kısaca tanımlamak zordur ancak bir gebeliği normal gebelik olarak kabul edebilmek için gebeliğin; uterin kavitede, canlı fetus veya embriyo olarak tespit edilmesi (mol gebelik, inkomplet abortus....vb. dışlanarak), term döneme kadar diğer gebelik durumlarıyla (gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, intrauterin gelişme geriliği, erken doğum, erken membran rüptürü...vb.) komplike olmadan gelebilmesi ve termde canlı olarak doğabilmesi gerekir (1).

**Embriyonik dönem:** Konsepsiyondan 2 hafta sonra başlar ve 8. haftanın sonunda biter. Bu dönem organogenez dönemi olarak bilinir ve teratojenler açısından önemlidir.

**Fetal dönem:** Gebeliğin 8. haftasından sonra başlayan dönemdir.

**Antenatal dönem:** Konsepsiyonla doğum zamanı arasındaki süredir.

**Perinatal dönem:** 20. gebelik haftası bittikten

sonra başlayan ve doğumdan sonra 28. gebelik haftası bitene kadar geçen süredir.

**Term gebelik:** 37-42. gebelik haftası arasındaki gebelik demektir.

**Preterm gebelik:** 37. gebelik haftasındaki gebelik demektir.

- ◆ Erken preterm: 34. gebelik haftasının altındaki gebeliği tanımlar.
- ◆ Geç preterm: 34- 36. gebelik haftası arasındaki gebeliği tanımlar.

**Postterm gebelik:** 42. gebelik haftasından sonraki gebeliklerdir.

**Gravide:** Şuanda gebe olan veya daha önce gebelik yaşamış kadını tanımlar.

- ◆ Nulligravide: Hiç gebelik yaşamamış, şuan gebe olmayan kadın.
- ◆ Primigravide: İlk gebeliğini yaşayan kadın.
- ◆ Multigravide: Birden fazla gebelik yaşamış kadın.

**Parite:** 20. gebelik haftasını doldurmuş ölü veya canlı sonuçlanmış doğumlar.

- ◆ Nullipar: 20. gebelik haftasından sonra ölü veya canlı doğum yapmamış kadın.
- ◆ Primipar: 20. gebelik haftasından sonra 1 kez ölü veya canlı doğum yapmış kadın.
- ◆ Multipar: 20. gebelik haftasından sonra 2

<sup>1</sup> Dr. Öğr. Üyesi Dilay KARADEMİR, Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. dilaykarademir@cumhuriyet.edu.tr



## KAYNAKLAR

1. Tamara L.C. Blueprints Obstetrics and Gynecology. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
2. Medforth J, Ball L, Walker A, Battersby S, Stables S. Oxford Handbook Of Midwifery. 3th edition. Oxford Medical Publications; 2017.
3. Milller A, Hanretty K, Callander R, Ramsden I. Obstetrics İllustrated. Güneş Kitabevi; 2003.
4. Clifford A, Kelly C, Yau C. Obstetrics, Gynaecology and Women's Health on the move. Taylor and Francis Group; 2013.
5. Dutta D. Textbook of DC Dutta's Obstetrics. 8th edition. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd; 2015.
6. Cunningham F, Leveno K, Bloom S et al. Williams Obstetrics. 24th edition. McGraw-Hill Education; 2014.
7. Beckmann C, Ling F, Barzansky B et al. ACOG Obstetrics and Gynecology. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
8. Ayhan A, Durukan T, Günalp S et al. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 2.Baskı. Güneş Kitabevi; 2008.
9. Çetin A. Kadın Hastalıkları ve Doğum El Kitabı. Ser-tan Avrasya Yayıncılık ve Dağıtım Şti; 2012.
10. Callahan T, Caughey A. Blueprints Obstetrics and Gynecology. 7th edition. Wolters Kluwer; 2018.
11. Sackey J, Blazey-Martin D. The preconception office visit. Up To Date; 2020.

