

Bölüm 4

KORNEA

Onur ÖZALP¹
Zülfiye KÖKTAŞ²
Eray ATALAY³

4.1. YÜZEYEL NOKTASAL KERATOPATİ

Semptomlar

Ağrı, fotofobi, kırmızı göz, yabancı cisim hissi, hafif derecede görme azalması.

Bulgular

(BKZ. RESİM 4.1.1.)

Önemli. Korneal epitel defektleri floresein ile boyanır. Ağır olan olgularda birleşik olabilir. Boyanma paterni etyolojiye işaret edebilir. Anestezik damlalar ile ağrı geçer.

 **NOT:** Ağrının anestezik damlalar (örneğin, proparakain) ile geçmesi, ağrının etyolojisi olarak korneal epitelyal hastalığı kuvvetle düşündürür. Anestezik damla damlatılması oküler muayenenin önemli bir parçası olmasına rağmen, hastalara ASLA topikal anestezik damla reçete edilmemelidir ve klinisyen, hastanın ofisten anestezik damla almasını önlemelidir. Bu damlalar kronik olarak kullanıldığında epitel iyileşmesini engeller ve korneal ülserlere yol açabilmektedir.

Diğer. Konjonktival enjeksiyon, sulu akıntı.

¹ Uzm. Dr., Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, dronurozalp@gmail.com

² Uzm. Dr., Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, z_koktas@hotmail.com

³ Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD., erayat@gmail.com