

Bölüm 7

ORBİTA

Ayşe İdil ÇAKMAK¹

Ela EREN²

Mehmet Fatih Kağan DEĞİRMENCİ³

Leyla NİYAZ⁴

7.1. ORBİTA HASTALIKLARI

Bu bölüm çeşitli orbita hastalıklarını değerlendirmek için bir yaklaşım şekli sağlar.

Semptomlar

Göz kapağında ödem, şişkin göz(ler) ve çift görme sıktır. Ağrı, görme keskinliğinde azalma ve renkli görmede azalma meydana gelebilir.

Bulgular

Önemli. Glob distopisi (örn. proptozis, ekzoftalmus, hipoglobus, hiperglobus) ve zorlu düksiyon testi ile doğrulanabilen oküler hareketlilikte kısıtlanma (**BKZ. EK 6, ZORLU DÜKSİYON TESTİ VE AKTİF GÜÇ OLUŞTURMA TESTİ**). Globun geriye doğru hareketine karşı direnç ile sık karşılaşılır.

Proptozis Ayırıcı Tanısı

- Kitle etkisi (örn. yumuşak dokuların enflamatuvar, neoplastik veya enfeksiyöz nedenlerle infiltrasyonu veya yer değiştirmesi).
- Genişlemiş glob (örn. miyopi). Büyük, miyopik gözlerde sıklıkla tilte disk ve peripapiller kresent ve ultrasonografide (US) aksiyel uzunlukta artış mevcuttur. Asimetrik miyopi tek taraflı proptozis ile ortaya çıkabilir.
- Diğer gözde enoftalmi (örn. orbita taban kırığı sonrasında).
- Asimetrik göz kapağı pozisyonu: Tek taraflı üst ve/veya alt kapak retraksiyonu veya kontralateral üst kapak pitozu.

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD, idilayse@yahoo.com

² Uzm. Dr., Hatay Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, elakarakurt@hotmail.com

³ Uzm. Dr., Çankırı Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, kaganmf@gmail.com

⁴ Doç. Dr., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD, leyla.niyaz@omu.edu.tr