

Bölüm 9

GLOKOM

Mehmet Akif EROL¹
Saadet GÜLTEKİN IRGAT²
Tülay ŞİMŞEK³

9.1. PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM

Semptomlar

Geç döneme kadar genellikle asemptomatiktir. Semptomlar görme alanı kayıplarını içerebilir. Tünel görme ve merkezi fiksasyon kaybı tipik olarak hastalığın geç dönemlerine kadar görülmez.

Bulgular

- Göz içi basıncı (GİB): Hastaların çoğunda GİB yüksek (normal aralık 10 ila 21 mm Hg) olsa da herhangi bir taramada yaklaşık yarısında GİB değeri 21 mm Hg veya altında çıkmaktadır.
- Gonyoskopi: Gonyoskopik değerlendirmede, ön kamara açısı açık ve normal görünümündedir. Periferik anterior sineşi (PAS) yoktur.
- Optik sinir: (Bkz. **ŞEKİL 9.1.1.**) Karakteristik görünümüler arasında şu özellikler bulunur; rim dokusu kaybı (çentiklenme; en sık altta daha sonra üstte, daha nadiren nazal veya temporalde olmak üzere artmış ve/veya progresif daralma), disk kenarından geçen kıymık veya sinir lifi tabakası kanaması (Drance kanaması), edinilmiş pit, sinir lifi tabakası defekti, bir neden yokken (örn., Anizometri, farklı sinir boyutları) çukur/disk (C/D) asimetrisi > 0.2 , kroşelenme (sinirden çıkarken kan damarlarının keskin açılanması), genişlemiş C/D oranı (> 0.6 ; daha az spesifik), çukur yapısının ilerleyici genişlemesi, Disk Hasarı Olasılık Ölçeği (DDLS) puanının daha yüksek olması (Bkz. **RESİM 9.1.2.**)

¹ Uzm. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, dr.akiferol@gmail.com

² Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim Araştır Hastanesi Göz Hast. AD, saadet_g@yahoo.com

³ Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, tulaysimsek@hotmail.com