

Bölüm 11

RETİNA

Mustafa Değer BİLGEÇ¹
Erdoğan YAŞAR²
Uğur GÜRLEVİK³
Nazmiye EROL⁴

11.1. ARKA VİTREUS DEKOLMANI

Semptomlar

Loş aydınlatmada ve temporal görme alanında daha yaygın olan uçuşan cisimler, bulanık görme ve ışık çakmaları.

Bulgular

Önemli. Optik disk üzerinde asılı duran, genellikle bir halka (“Weiss halkası”) veya kırık halka şeklinde olan bir veya daha fazla yarı saydam veya açık gri vitreus opasitesi (**BKZ. RESİM 11.1.1**).

Diğer. Retina yırtığı (yırtilma), retina dekolmanı (RD) veya vitreus kanaması (VK), benzer semptomlarla arka vitreus dekolmanı (AVD) olsun veya olmasın meydana gelebilir. Periferik retina ve optik disk kenarı kanamaları, ve ön vitreusa retina pigment epitel hücrelerini serbestleştirir (“tütün tozu” veya Shafer işareti).

 **NOT:** Akut semptomatik AVD’li tüm hastaların yaklaşık % 8 ila %10’unda retina yırtığı vardır. Akut AVD ile ilişkili olarak anterior vitreusta pigmentli hücrelerin varlığı veya VK, birlikte olan bir retina yırtığının yüksek olasılığını (>% 70) gösterir. **BKZ. 11.2, RETİNAL YIRTIK.**

¹ Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD., mdbilgec@hotmail.com

² Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD., dre.yasar@gmail.com

³ Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD., ugurlevik@hotmail.com

⁴ Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD., nazmiyeerol@hotmail.com