

Bölüm 13

GENEL OFTALMİK PROBLEMLER

Hamidu Hamisi GOBEKA¹

Şefikcan İPEK²

Ezgi Karataş YİĞİTASLAN³

13.1. EDİNSEL KATARAKT

Semptomlar

Bir veya iki gözü etkileyen, genellikle aylar ya da yıllar süren, yavaş ilerleyen görme kaybı veya bulanıklık. Özellikle parlak güneşte veya gece sürüş sırasında karşıdan gelen farlardan kaynaklanan kamaşma ve renk algısında değişiklik meydana gelebilir, ancak optik nöropatilerde olduğu kadar değil. Kataraktın özellikleri, ilgili semptomları belirlemektedir.

Bulgular

(Bkz. RESİM 13.1.1)

Önemli. Normalde berrak kristal merceğin opaklaşması veya renginin bozulması.

Diğer. Retinoskopide kırmızı refleksin kayması ile birlikte retinal görüntünün bulanıklaşması. Nükleer sklerozdan miyopik kayma, “ikinci görüş” olarak adlandırılan yakın görmenin artmasına neden olabilir. Tek başına katarakt, göreceli afferent pupil defektine (RAPD) neden olmaz.

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD, hgobeka@gmail.com

² Uzm. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi EAH. Göz Hast. Kliniği, sefikcan ipek@gmail.com

³ Uzm. Dr., Ağrı Diş Hekimliği Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, e.karatas.2015@gmail.com