

Bölüm 1

OKÜLER SEMPTOMLARIN AYIRICI TANISI

Kayhan MUTLU¹

YANMA

Sıklıkla: Blefarit, meibomit, kuru göz sendromu, konjonktivit (enfeksiyöz, alerjik, mekanik, kimyasal)

Daha az sıklıkta: korneal epitelyal defekt (genellikle florosein ile boyatılan), enflamasyon pterijyum veya pingekula, episklerit, süperior limbik keratokonjonktivit, oküler toksisite (ilaç, makyaj, kontakt lens solüsyonu), kontakt lens ile ilişkili problemler.

ÇOCUKLARDA GÖZLERDE KAYMA

Bkz. 8.4, EZODEVIASYON (içeri kayma), veya **Bkz. 8.5, Ekzodeviasyon** (dışa kayma)

GÖRME AZALMASI

1. Geçici görme kaybı (görme 24 saat içinde normale döner, genellikle 1 saat içinde) normale döner.

Sıklıkla: Birkaç saniye (genellikle iki taraflı): Papil ödem. Birkaç dakika: Amarozis fugaks (geçici iskemik atak; tek taraflı), vertebro baziller arter yetmezliği (iki taraflı). 10 ila 60 dakika: Migren (sonrasında baş ağrısı ile beraber olan veya olmayan)

Daha az sıklıkta: Santral retinal ven tıkanıklığı hemen öncesinde, iskemik optik nöropati, oküler iskemik sendrom (karotis tıkaçıcı hastalık), glokom, kan basıncında ani değişiklikler, merkezi sinir sistemi (SSS) lezyonu, optik disk druzeni, orbital lezyon (görme kaybı göz hareketi ile ilişkili olabilir).

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, 68er500@gmail.com