



BÖLÜM 16

KOMPLİKASYONLAR, İSTENMEYEN SONUÇLAR VE REVİZYONLAR

Fulya UZUN¹

GİRİŞ

Kadın genital kozmetik operasyonları özellikle son dekatta gittikçe yaygınlaşan ve popüleritesi artan bir işlem halini almıştır. Popüleritenin artmasında yeni trendler ve farkındalığın artması da önemli bir rol oynamaktadır. Sayıların artması ile komplikasyonların görülme sıklığı ve revizyona ihtiyaç duyan hasta sayısı artmıştır. Ancak ne yazık ki bu işlemlerin pazarlanmasında erken veya geç komplikasyonlarına hiç yer verilmezken; kanıtlanmamış fiziksel, psikolojik ve cinsel yararları abartılı şekilde anlatılmaktadır.⁽¹⁾

KOMPLİKASYON VE REVİZYON İHTİYACI AÇISINDAN KOZMETİK JİNEKOLOJİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Kozmetik jinekoloji uygulamalarının her birinin kendine has komplikasyonları olabilmektedir. Klinisyen bu komplikasyonları iyi bilmeli, hastasına işlem öncesinde oluşabilecek komplikasyonlar ve revizyonlar hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.

Labioplasti

Labioplasti; labia minora veya labia majoraların cerrahi olarak küçültülmesi anlamına gelse de daha sıklıkla labia minoraya yapılan uygulamaları ifade etmektedir. Çünkü labia minora redüksiyonları, labia majora redüksiyonlarına göre daha sık yapılmaktadır.^(2,3) Labia minoranın cerrahi olarak küçültülmesi, kadın genital kozmetik operasyonlar içinde en sık yapılan üç operasyondan biridir. Ancak ameliyatın endikasyon açısından net parametreleri yoktur ve daha çok kişinin kendi isteğine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Labial hastalık veya yapisal bozukluğa sekonder yapılan operasyonlar ise nadirdir.

¹ Op. Dr., Mardin Devlet Hastanesi, fulyademet33@gmail.com



detaylıca anlatılması önemlidir.⁽²⁷⁾ FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) enerji temelli tedavileri kozmetik jinekolojide veya vajinal semptomların tedavisinde güvenilirlik ve etkinliğinin tam bilinmemesinden dolayı onay vermemektedir. FDA; bu cihazlarla yapılabilecek işlemlerin vajinal yanık, skarlaşma, disparoni, tekrarlayan veya kronik ağrı gibi komplikasyonlara neden olabildiğini belirtmiştir.⁽²⁸⁾ Ancak yayınlarda bu tekniklerin düzgün kullanıldığında saptanan majör komplikasyon oranının %1'den az olduğu belirtilmektedir.⁽²⁶⁾ Çok nadir vakalarda ise koit sırasında kalıcı duyu kaybı veya ağrı oluşabilmektedir. Ancak en sık görülen komplikasyonun kişinin istediği sonuçlara ulaşamaması olduğu unutulmamalı ve seans öncesi hastaya hayal pazarlanmamalıdır.

SONUÇ

Kozmetik jinekoloji ameliyatları yüksek genel memnuniyet oranlarına sahip olsada çeşitli komplikasyonları mevcuttur. İlk ameliyat endikasyonu ne olursa olsun, revizyon ameliyatları son derece zor ve deneyim gerektirir. Özellikle ana endikasyon işlevsel olduğunda komplikasyonlar ve revizyonlar son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle hastalara endikasyonu ne olursa olsun cerrahi operasyonun komplikasyonları konusunda detaylı bilgi verilmeli ve hastalara düşünceleri için yeterli zaman tanınmalıdır. Komplikasyon veya istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında revizyonun zor olabileceği ve her zaman mümkün olmadığı bilgisi verilmelidir.⁽²⁹⁾

KAYNAKLAR

1. Liao LM, Taghinejadi N, Creighton SM. An analysis of the content and clinical implications of online advertisements for female genital cosmetic surgery. *BMJ Open*. 2012;2:e001908.
2. ACOG. Elective Female Genital Cosmetic Surgery: ACOG Committee Opinion, Number 795. *Obstet Gynecol*. 2020;135:e36-e42.
3. Goodman, M. P. (Ed.). (2020). *Kadın Genital Plastik ve Kozmetik Cerrahisi*. (Gökçen Erdoğan, Çev. Ed.). Ankara: Modern Tıp Kitabevi
4. Oranges CM, Sisti A, Sisti G. Labia minora reduction techniques: a comprehensive literature review. *Aesthet Surg J*. 2015;35:419-431.
5. Runacres SA, Wood PL. Cosmetic Labiaplasty in an Adolescent Population. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2016;29:218-222.
6. Garcia B, Scheib S, Hallner B et al. Cosmetic gynecology-a systematic review and call for standardized outcome measures. *Int Urogynecol J*. 2020;31:1979-1995.
7. Alter GJ. Labia minora reconstruction using clitoral hood flaps, wedge excisions, and YV advancement flaps. *Plast Reconstr Surg*. 2011;127:2356-2363.
8. Schober JM, Alguacil NM, Cooper RS et al. Self-assessment of anatomy, sexual sensitivity, and function of the labia and vagina. *Clin Anat*. 2015;28:355-362.
9. Goodman MP, Placik OJ, Benson RH 3rd et al. A large multicenter outcome study of female genital plastic surgery. *J Sex Med*. 2010;7:1565-1577.
10. Placik OJ, Arkins JP. A prospective evaluation of female external genitalia sensitivity to pressure following Labia minora reduction and clitoral Hood reduction. *Plast Reconstr Surg*. 2015;136: 442e-452e.
11. Abedi P, Jamali S, Tadayon M et al. Effectiveness of selective vaginal tightening on sexual function among reproductive aged women in Iran with vaginal laxity: a quasi-experimental study. *J Obstet Gynaecol Res*. 2014;40:526-531.
12. Erbaba H, Pınar G. Postpartum Perineal Travmanın Önlenmesi ve Yönetimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi* 2016; 13: 272-281.
13. Rouzier R, Haddad B, Deyrolle C et al. Perineoplasty for the treatment of introital stenosis related to vulvar lichen sclerosis. *Am J Obstet Gynecol*. 2002;186:49-52.
14. Kurban, D. (2020). *Genital Estetik Cerrahi Uygulamalar*. Ö. F. Karataş, S. Sarıkaya, S. Eserdağ (Ed.), *Cinsel Tıp ve Genital Estetik* içinde (s. 197-209). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.



15. Pardo JS, Sola VD, Ricci PA et al. Colpoperineoplasty in women with a sensation of a wide vagina. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2006;85:1125-1127.
16. Moore RD, Miklos JR. Vaginal reconstruction and rejuvenation Surgery: Is there data to support improved sexual function?. *Am J Cosmet Surg*. 2012;29:97-113.
17. Abed H, Rahn DD, Lowenstein L et al. Incidence and management of graft erosion, wound granulation, and dyspareunia following vaginal prolapse repair with graft materials: a systematic review. *Int Urogynecol J*. 2011;22:789-798.
18. Porges, R. F. (2010). *Anterior Colporrhaphy*. GLOWN. (26.08.2021 tarihinde <https://www.glowm.com/section-view/heading/Anterior%20Colporrhaphy/item/44#.YSc0MlgzblV> adresinden ulařılmıştır.)
19. Tyagi V, Perera M, Guerrero K et al. Prospective observational study of the impact of vaginal surgery (pelvic organ prolapse with or without urinary incontinence) on female sexual function. *Int Urogynecol J*. 2018;29:837-845.
20. Cundiff GW, Fenner D. Evaluation and treatment of women with rectoceles: focus on associated defecatory and sexual dysfunction. *Obstet Gynecol*. 2004;104:1403-1421.
21. Mellgren A, Anzén B, Nilsson BY et al. Results of rectocele repair. A prospective study. *Dis Colon Rectum*. 1995;38:7-13.
22. Song AY, Jean RD, Hurwitz DJ et al. A classification of contour deformities after bariatric weight loss: the Pittsburgh rating scale. *Plast Reconstr Surg*. 2005;116:1535-1544.
23. Leye E, Ogbe E, Heyerick M. 'Doing hymen reconstruction': an analysis of perceptions and experiences of Flemish gynaecologists. *BMC Womens Health*. 2018;18:91.
24. Essén B, Blomkvist A, Helström L et al. The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration (hymen repair). *Reprod Health Matters*. 2010;18:38-46.
25. Wild V, Poulin H, McDougall CW et al. Hymen reconstruction as pragmatic empowerment? Results of a qualitative study from Tunisia. *Soc Sci Med*. 2015;147:54-61.
26. Jha S, Hillard T. Energy devices in vaginal therapy. *The Obstetrician & Gynaecologist*. 2019;21: 233-236.
27. Tailor V, Digesu GA, Vieira-Baptista P et al. Academic cosmetic gynaecology and energy-based therapies: ambiguities, explorations, and FDA advisories. *Int Urogynecol J*. 2019;30:1021-1022.
28. FDA (2018). *Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on efforts to safeguard women's health from deceptive health claims and significant risks related to devices marketed for use in medical procedures for "vaginal rejuvenation"*. (26.08.2021 tarihinde <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fda-commissioner-scott-gottlieb-md-efforts-safeguard-womens-health-deceptive-health-claims> adresinden ulařılmıştır.)
29. Lallemand M, Porté C, Laroche J et al. Nymphoplasties de réduction fonctionnelle ou esthétique. Complications, réinterventions, résultats : étude comparative [Functional or aesthetic labia minora reduction: Complications, revision surgeries and results - a comparative study]. *Gynecol Obstet Fertil Senol*. 2019;47:330-336.