

Meme ve Aksilla Muayenesi

Bölüm

7

Dr. Ekmel TEZEL

Klinik Topografik Anatomi

Meme tabanı 2. / 3. kot ile 6. / 7. kot arasında bulunur. Lateral sınırını ön aksiller çizgi, medial sınırını parasternal çizgi oluşturur. Ön aksillar çizgi tuberositas humeriden spina iliaca anterior superior'a (SİAS) uzanır. Parasternal çizgi sternum ile kostaların bileşkesinden orta hatta paralel geçen çizgidir. Meme ucunun midklaviküler çizgi üzerinde olduğu kabul edilir. Midklaviküler çizgi klavikulanın orta noktasından inguinal ligamanın ortasına kadar uzanan bir çizgidir.

Meme ucu memenin ortasında biraz aşağıya ve dışa doğrudur. Üstündeki deri düzensiz ve pigmentedir. Çevresinde aynı yapıda, pigmente 1-2 cm yarıçapında areola vardır. Her ikisine meme ucu-areola kompleksi (*nipple areola complex*-NAC) denir. Areolanın deri altı dokusu dik ve dairesel yerleşmiş kaslardan oluşur.

Meme dokusu süperfisiyel torasik fasyanın iki yaprağı (yüzeyel ve derin yaprakları) arasında yer alır. Her iki fasya yaprağı arasında uzanan ve meme dokusunu destekleyen ve şeklini korumasını sağlayan Cooper (suspansuar) ligamanları vardır. İnvaziv tümörler bu ligamanları invaze ederek boylarının kısalmasına neden olarak meme derisinde çekintilere neden olurlar.

Aksiller fossa, lateralde latissimus dorsi kasının ön kenarı, medialde toraks duvarı ve pektoralis majörün lateral kenarı, superiorda humerus ve inferiorde serratus anterior kasları arasında kalan lenfatikten zengin yağ dokusu içeren bir anatomik bölgedir. Posterior duvarını skapulunun ön yüzü ve burada bulunan subskapüler kas oluşturur. Bu bölgede iki önemli sinir bulunur: Medialde bulunan nervus torasicus longus (serratus anterior kaslarını